



Kompania provinciale e shërbimeve shëndetësore

Fletë informacioni: Lamje

Çfarë janë ata? Lamjet kanë pamjen si një larve e bardhe të vogla rreth një centimeter të gjatë, të holla dhe të lëvizshme. Ata quhen gjithashtu *Enterobius vermicularis* dhe jetojnë ekskluzivisht në zorrë të njeriut, sidomos në ampulën e zorrëve dhe të zorrës së trashë.

Ata përfaqësojnë formën më të zakonshme të parazitozës intestinale tek njerëzit.

Është vlerësuar se mesatarisht 10% e fëmijëve janë të infektuar me lamje.

Ata janë si rezultat i zakonshëm mes fëmijëve dhe nuk janë të rrezikshme për shëndetin.

Femra e rritur e Lamjeve është afërsisht një centimetër e gjatë me një seksion prej rreth 0.5 mm, ndërsa meshkujt janë më të vogël.

Lamjet e të rriturve janë të dukshme me sy të lirë, në formën e fijos, të vogla të bardha dhe që lëvizin ose në zonën perianale gjatë orëve të hershme të mëngjesit.

Si vjen infeksioni

Transmetimi ndodh nëpërmjet rrugës të fekaleve, domethene, me gëlltitjen e vezëve të tyre. Femrat e këtyre krimbave, natën dhe herët në mëngjes, dalin nga anusi dhe depozitojnë vezët në nivelin anal anësor; prandaj fëmija paralajmëron një ndjenja kruarje intensive.

Në duart e fëmijës mbesin mbetjet e nevojës të kontaminuara me vezët e lamjeve që mund të transferohen në objekte të përditshme (lodra, lapsa, peshqireve dhe të brendshme).

Nëse një tjetër fëmijë, ose një i rritur, i prek të njëjtat objekte ose i sjell duart tek goja, hani vezët që hapen pas rreth një muaji në zorrë duke shkaktuar rritjen e lamjeve të rritura.

Femrat e këtyre të rriturve të rinj, nga ana tjetër, ata do të depozitojnë vezët në nivelin e grykës anal duke rifilluar ciklin.

Në kundërshtim me atë që ndodh për shumë parasite të tjerë, vezët e lamjeve bëhen të pasigurtë pas vetëm disa minutave nga depozitimi i tyre. Lamjet mund të transmetohet lehtë edhe nga fëmijët në të rriturit.

Cilat janë simptomat

Edhe pse shumica e njerëzve nuk kanë simptoma, infektimi i lamjeve njihet simptomën e saj më të zakonshme në kruarje perianale. Kjo shenjë bëhet më intensive dhe shqetësuese në orët e hershme të natës, shtrihet në zonë perineal (hapësirë mes anusit dhe organeve gjenitale) dhe tek vajzat në zonën vagjinale, është e mërzitshme dhe mund të shkaktojë shqetësim dhe kruarje intensive. **Si njihen**

Ato janë të dukshme në nevojat dhe konfirmimi i pranisë së tyre bëhet dhe me i thjeshtë në një "test provë", i cili konsiston në vendosjen e një rripi të hollë ngjës transparente në zonën perianale të pacientit. Edhe ky operacion do të kryhet në mëngjes, para evakuimit dhe larjes. Vezët parazitare mbetën të ngjitura në pjesën e ngjeshur edhe identifikohen lehtë me përdorimin e një lente.

Çfarë duhet të bëni nëse ndodh një rast

Sjellja e duhur e higjienës parandalon ngjitjen dhe reinfektimin:

■ Lani duart pas shkuarjes në tualet, pasi luani jashtë, dhe para ngrënies, duke u kujdesur që t'i lajnë mirë me ujë dhe sapun, pastrim me kujdes edhe nën thonjtë.

■ kujtojini fëmijëve të mos kruhen në pjesën e poshtme dhe mos i vendosni

duart në gojë

Në rast se fëmija është i infektuar nga lamjet

■ Merrni një terapi specifike, sipas udhëzimeve të mjekut tuaj. Trajtimi farmakologjik duhet gjithashtu të shtrihet tek të gjithë anëtarët e bërthamës familjare, me qëllim që të zhduken përfundimisht prania e ketyre parazitëve.

■ ndërroni të brendshmet, qerqafet dhe peshqirët me frekuencë më të lartë se zakonisht, pas dushit dhe gjithmonë pas ditës që keni marrë ilaçet. Qërqafet dhe mbathjet (duke përfshirë dhe pizhamet) duhet të hiqen duke i kushtuar vëmendje për të shmangur shpërndarja e vezëve në ajër dhe duhet të lahet në lavatriqe në 60 ° C.

■ Iani lodrat me detergjent / dezinfektues të përdorur zakonisht që gjenden në treg

■ për larjen e duarve përdorni sapun të lëngët dhe mundësisht peshqir letre për të që e mundur të hidhen në plera.

Kontaktet Higjiena dhe Shëndeti Publik Qendra e Veriut: Viale Verona - Pall. D - 38123 TRENTO Telefoni 0461/902266 Faksi 0461/902357 email: IgienePubblicaTrento@apss.tn.it